



**SociNova**

Gabinete de Investigação em Sociologia Aplicada  
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
Universidade Nova de Lisboa

# **Prevenir ou Remediar**

**Os custos sociais da violência  
contra as mulheres**

Manuel Lisboa

**Lisboa, 2007**



## ***Custos profissionais***

### **. Dificuldade de arranjar emprego**

**[69% + provável de ocorrer entre as vítimas]**

#### ***Caso1: perder oportunidades***

***«... Eu sinto muitas vezes que perdi muito tempo, por exemplo, podia ter tirado a carta (...) que eu não tirei, até agora (...) podia ter entrado na universidade num curso que eu gostava logo a seguir (...) sinto que perdi tempo... (...)»***



## . Dificuldade em ser promovida

**[74% + provável de ocorrer entre as vítimas]**

### **Caso1: faltar ao trabalho**

**«... Estive muito tempo de baixa. (...) um mês e tal, depois voltava ao trabalho, depois estava mais um tempo, era mais ou menos assim (...)**

**- Tomei várias vezes comprimidos para dormir, e muitos, caixas (...)**

**- Fiz duas ou três vezes lavagens ao estômago. Porque já não aguentava mais... (...)**»



## . Despedimento e/ou auto-despedimento

**[107% + provável de ocorrer entre as vítimas]**

### **Caso1: vergonha e auto-despedimento**

***«... Passado uma semana, ele esmurrou essa pessoa toda, essa pessoa nunca mais me pôde ver à frente, porque ele bateu-lhe [baixa um pouco a voz] em pleno [local de trabalho com atendimento ao público], uma vergonha (...)***

***Entrevistadora: Foi uma vergonha para si.***

***-Eu despedi-me, porque não aguentava ir para lá trabalhar... (...)***»



## **Saúde Física** [ + provável ocorrer nas vítimas]

- Equimoses/hematomas [82% +]
- Feridas [100% +]
- Coma [94% +]
- Hemorragias [94% +]
- Intoxicações [79% +]
- Lesões genitais [73% +]
- Obesidade [57% +]



## ... *Saúde Física*

[ + provável ocorrer nas vítimas]

- Asma [46% +]
- Queimaduras [46% +]
- Palpitações [44% +]
- Tremores [43% +]
- Colite [42% +]
- Cefaleias [40% +]
- Vômitos frequentes [40% +]
- Dermatite [37% +]
- Úlcera gastro-duodenal [37% +]
- Dificuldades respiratórias [37% +]
- Sudação [36% +]
- Hipertensão arterial [26% +]

...



## ***Saúde Psicológica***

**[ + provável ocorrer nas vítimas]**

- Consulta de psicólogo/psiquiatra **[200% +]**
- Desespero – sempre **[556% +]**
- Sentir vazio – sempre **[479% +]**
- Desânimo – sempre **[368% +]**
- Sentimento de culpa – sempre **[355% +]**
- Tristeza e pesar – sempre **[344% +]**
- Prazer e alegria –nunca **[211% +]**
- Auto- desvalorização – sempre **[128% +]**
- Ansiedade – sempre **[112% +]**



## ... *Saúde Psicológica*

[ + provável ocorrer nas vítimas]

- Falta de esperança [61% +]
- Solidão [58% +]
- Alucinações audiovisuais [117% +]
- Sensação de desmaio [200% +]
- Ideação suicida [300% +]
- Tentativas de suicídio [600% +]



## *Os filhos assistem às agressões*

*«... Entrevistadora: Os miúdos assistiam?»*

*- Assistiam (...)*

*- Não fazia nada, chorava. (...) Chorava sempre em silêncio [chora], é um bocado complicado... (...)*»

- Filhos doentes (1) **[90% + provável entre as vítimas]**
- Filhos com mau ambiente de trabalho escolar em casa (2) **[ 3400% + provável entre as vítimas]**

Fonte: (1) Manuel Lisboa, in *Prevenir ou Remediar*

(2) António Nóvoa e Sofia Marques da Silva, in *Prevenir ou Remediar*