



Observatório Europeu da
Droga e da Toxicodependência

A droga na União Europeia

Situação e tendências 2014

Comissão de Saúde da Assembleia da República
Lisboa, 7 de janeiro de 2015

A panorâmica geral na Europa em 2014

- Estabilização e diminuição nos indicadores de heroína e cocaína na UE, mas preocupações relativas às substâncias usadas em alternativa
- Drogas sintéticas, incluindo novas substâncias psicoativas (NSP) — um mercado dinâmico e multifacetado
- Progresso claro relativo a alguns dos principais objetivos de saúde pública
- Algumas exceções a nível nacional colocam ainda desafios




Novas drogas



Novas substâncias psicoactivas — sem sinais de diminuição

Number and main groups of new psychoactive substances notified to the EU Early Warning System, 2005–13



Sistema de Alerta Rápido

4 Avaliações de risco em 2014

- 25I-NBOMe (alucinogénio)
- MDPV (estimulante)
- AH-7921 (opiáceo)
- Metoxetamina (propriedades semelhantes à Ketamina)

Mais medicamentos vendidos como 'legal highs', 'químicos de investigação' e 'suplementos alimentares'





emcdda

Cannabis



Cannabis: a droga mais utilizada na Europa


73.6 milhões de adultos consumiram pelo menos uma vez na vida

14.6 milhões de jovens adultos consumiram nos últimos 12 meses

Quase 1% de adultos consome diariamente

Droga mais frequentemente mencionada para novos tratamentos

Last year prevalence of cannabis use among young adults (15–34):
most recent data





Produção doméstica aumenta

Inovação

Cultivo de plantas com elevados níveis de THC

A potência aumenta quer para a erva quer, mais recentemente, para a resina



Opiáceos




1.3 milhão de pessoas com consumos problemáticos de opiáceos


Heroína: diminuem novos pedidos de tratamento

Mas aumentam para outros opiáceos...

Trends in first-time entrants




First-time entrants for opioids other than heroin: trends in numbers



Mais de um milhão em tratamento de substituição na Europa

Predominant opioid substitution medication as a proportion of substitution clients in Europe





50% cobertura para consumidores problemáticos de opiáceos

A metadona é o tratamento mais comum (67%)


Progresso em objetivos de saúde pública

Mortes por *overdose*: redução na Europa apesar do aumento verificado em alguns países



Consumo por via injectável: diminuição clara

VIH: surtos na Grécia e Roménia influenciam tendência Europeia




Estimulantes



Um mercado geograficamente dividido

2.2 milhões de jovens adultos Europeus (15–34) consumiram cocaína nos últimos 12 meses

Predominant stimulant drug by last year prevalence among young adults (15–34)




1.2 milhão consumiu anfetaminas

1.3 milhão consumiu ecstasy


Cocaine Ecstasy Amphetamines No data

Cocaína: continuam sinais de diminuição...

Estimulante mais utilizado, mas verificam-se diminuições nos países com prevalências mais elevadas




Last year prevalence of cocaine use among young adults (15–34): selected trends



e, nos primeiros pedidos de tratamento

... também na oferta


Number of cocaine quantity seized, 2002–12



Quantidades apreendidas — estável


Número de apreensões —
ligeira, mas continuada,
diminuição

Number of cocaine seizures, 2002–12



Anfetaminas e metanfetamina

Consumo de anfetaminas estável mas novos surtos e tendências nos consumos de metanfetamina



Oferta: sinais de aumento de produção de metanfetamina




Ecstasy: mais disponibilidade de MDMA de elevado grau de pureza

- Prevalências baixas e estáveis
- Diminuição nas quantidades apreendidas, apesar de um pequeno aumento recente
- A pureza aumenta

Numbers of ecstasy tablets seized, 2002–12

Tablets (millions)



Netherlands United Kingdom Other countries
Germany Spain France Turkey




Purity and price indexes

Estimulantes: respostas na UE

Meta-análise de 6 revisões da literatura sobre o tratamento da dependência de cocaína

Redução de danos em meio recreativo:

- Existem standards na Europa (e.g. Club Health and Safer Nightlife) mas é necessária uma abordagem integrada
- Elaboradas linhas de orientação para lidar com emergências relacionadas com drogas



Club Health guidelines and recommendations for healthy and safer nightlife of youth



A set of standards to improve health and safety in recreational nightlife venues



Staff training for nightlife premises



NightSCOPE



Case studies of collected legislative and policy measures



Media influence on nightlife

Conclusões

- Mercado cada vez mais complexo — fosso entre novas/velhas substâncias cada vez menos relevante
- Os policonsumos são a norma — fronteiras esbatidas entre substâncias ilícitas, NSP, medicamentos e álcool
- As políticas e respostas que se centram numa substância perdem força
- Compreender estes novos padrões é essencial para a saúde pública





Observatório Europeu da
Droga e da Toxicoddependência

emcdda.europa.eu/edr2014

emcdda.europa.eu

 twitter.com/emcdda

 facebook.com/emcdda

 youtube.com/emcddatube

 flickr.com/photos/emcdda