

16 de junho de 2015

AUDIÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE LEI Nº 322 / XII / 4 (TABACO)

PRINCIPAIS FONTES:

ATTITUDES OF EUROPEANS TOWARDS TOBACCO AND ELECTRONIC CIGARRETTES – SPECIAL EUROBAROMETER 429 (MAIO DE 2015)

PORTUGAL PREVENÇÃO E CONTROLE DO TABAGISMO EM NÚMEROS, 2014 - DGS

RELATÓRIOS DO OBSERVATÓRIO NACIONAL DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DO PULMÃO



OBSERVATÓRIO
NACIONAL DAS
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

- . NA UE -28 700.000 ÓBITOS/ANO CAUSADOS PELO TABACO
- . 50% DOS FUMADORES MORREM PREMATURAMENTE
- . OS FUMADORES PERDEM, EM MÉDIA, 14 ANOS DEVIDA
- . **EM PORTUGAL CERCA DE 12.000 ÓBITOS/ANO CAUSADOS PELO TABACO (11.6% DOS ÓBITOS EM 2010)**

O TABACO É O PRINCIPAL INIMIGO DO APARELHO RESPIRATÓRIO E DO SISTEMA CARDIO -VACULAR

	PERCENTAGEM DE FUMADORES	
	UE – 28*	PORTUGAL
2012	28%	23%
2014	26% (-2%)	25% (+2%)

11 PAÍSES TEM PERCENTAGEM DE FUMADORES INFERIOR À NOSSA

A ATUAL LEI DO TABACO FALHOU ALGUNS DOS SEUS OBJETIVOS PRINCIPAIS



. MAIOR PERCENTAGEM DE FUMADORES NOS HOMENS DO QUE NAS MULHERES

	UE – 28	PORTUGAL
HOMENS	31%	30%
MULHERES	22%	12%



MAIOR PERCENTAGEM DE FUMADORES ATIVOS NOS GRUPOS ETÁRIO MAIS JOVENS

	UE – 28	PORTUGAL
15 A 24 ANOS	25%	25%
25 A 39 ANOS	33%	33%
40 A 54 ANOS	34%	31%
+ DE 55 ANOS	17%	15%

- . MAIOR PERCENTAGEM DE FUMADORES ENTRE OS DESEMPREGADOS (46%)
- . MAIOR PERCENTAGEM DE FUMADORES ENTRE OS TRABALHADORES MANUAIS (37%)
- . MAIOR PERCENTAGEM DE FUMADORES ENTRE OS QUE TÊM DIFICULDADES FINANCEIRAS:
 - QUASE SEMPRE: 44%
 - POR VEZES: 32%
 - QUASE NUNCA: 22%

TABAGISMO PROBLEMA SOCIAL!
NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA OS DIVERSOS GRUPOS

IDADE DE INICIAÇÃO NO CONSUMO DE TABACO

INICIAÇÃO AO CONSUMO DE TABACO

UE – 28	PORTIUGAL
17,6 ANOS	16,9 ANOS

SÓ EM ESPANHA O INÍCIO DO CONSUMO DE TABACO É MAIS CEDO DO QUE EM PORTUGAL

PERCENTAGEM DE JOVENS QUE REPORTAM FUMAR PELO MENOS UM CIGADRRO POR SEMANA (2009/2010)

	MASCULINO	FEMININO
11 ANOS	1,0%	1,0%
13 ANOS	3,0%	3,0%
15 ANOS	11,0%	10,0%

INTRODUÇÃO DO TABAGISMO NOS CURRÍCULOS ESCOLARES DOS ENSINOS BÁSICO, SECUNDÁRIO E COMPLEMENTAR
PROIBIÇÃO DA AQUISIÇÃO E CONSUMO DE PRODUTOS DE TABACO ANTES DOS 18 ANOS



JÁ ALGUMA VEZ TENTOU DEIXAR DE FUMAR?

UE – 28

PORTUGAL

20%

12%

PIOR SÓ NA HUNGRIA (11%)

INVERSAMENTE MAIS DE 3 EM CADA 10 FUMADORES DEIXARAM DE FUMAR NA SUÉCIA (35%), NA HOLANDA E NA DINAMARCA (31%)

NECESSIDADE DE REFORÇO DAS MEDIDAS DE APOIO À DESABITUAÇÃO TABÁGICA



FOI FUMADOR E DEIXOU DE FUMAR?

UE – 28

PORTUGAL

59% (- 1% DO QUE EM 2012)

32% (- 13% DO QUE EM 2012)

A PERCENTAGEM DE FUMADORES QUE EM PORTUGAL TENTARAM DEIXAR DE FUMAR É A MAIS BAIXA DA EUOPA

CONSULTAS DE DESABITAÇÃO TABÁGICA:

- NÚMERO DE LOCAIS EM QUE ESSAS CONSULTAS SE REALIZAM PASSARAM DE 223 EM 2009 PARA 116 EM 2013 (- 62%). GRANDES ASSIMETRIAS REGIONAIS
- O NUMERO DE CONSULTAS DE CESSAÇÃO TABÁGICA PASSOU DE 25765 EM 2009 PARA 21577 EM 2013 (- 17,4%)
- EM 2013 EM LISBOA E VALE DO TEJO REALIZARAM-SE 53% DAS CONSULTAS

GRATUIDADE / COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E A DOENTES DE RISCO.



EXPOSIÇÃO A FUMO PASSIVO

	UE – 28	PORTUGAL
EM ESTABLECIMENTO DE BEBIDAS	25%	43%
EM RESTAURANTES	12%	17%
NO LOCAL DE TRABALHO	27%	23%
NO DOMICÍLIO	-	27%*

* ABAIXO DOS 18 ANOS33,3%

NÚMEROS QUE APONTAM PARA A NECESSIDADE DE REVER A LEGISLAÇÃO

INSISTÊNCIA EM CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA OS RISCOS DO FUMO PASSIVO

ATENÇÃO ÀS EXCEPÇÕES PREVISTAS NA LEI QUE PARECEM DEMASIADO AMPLAS

ACELERAR A PROIBIÇÃO TOTAL DE FUMAR EM LOCAIS PÚBLICOS

NO ÚLTIMO ANO VIU ANÚNCIOS PROMOVEDO O A TABACO NO PAÍS?

	UE – 28	PORTUGAL
MUITAS VEZES	6%	3%
ÀS VEZES	18%	13%
RARAMENTE	16%	17%
TOTAL ANUAL DE SINS	40%	33%
NUNCA	56%	66%
NÃO SABE	4%	1%

NECESSIDADE DE INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO

ATENÇÃO ÀS MENSAGENS SUB-LIMINARES

TÊM AUMENTADO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO AS IMAGENS APELATIVAS DE FUMADORES.



CIGARRO ELECTRÓNICO

	UE – 28	PORTUGAL
USA HABITUALMENTE	2%	2%
JÁ USOU MAS EIXOU DE USAR	3%	1%
EXPERIMENTOU NO PASSADO	7%	3%
NUNCA USOU	87%	94%
DEIXOU DE FUMAR RECORRENDO AO E – CIGARRO?	14%	6%
ESTÁ CPNSCIENTE DOS RISCOS DO E – CIGARRO?	52%	57%
	(+ 25% DO QUE EM 2012)	(+ 30% DO QUE EM 2012)

NÃO ENTROU AINDA NOS HÁBITOS

ESCASO EFEITO NA DESABITUAÇÃO TABÁICA

RAZOÁVEL CONSCIÊNCIA DOS RISCOS

PROPOSTAS:

- 1 - Proibição absoluta de fumar antes dos dezoito anos de idade. (Monitorizar o CO)
2. Generalizar a proibição em espaços fechados e públicos, sejam fixos ou de transporte.
3. Reduzir ao máximo as exceções: Hospitais psiquiátricos e prisões.
4. Aumentar drasticamente o preço (4 vezes mais).
5. Promover a participação de 100% no tratamento de DPOCs com VEMS inferior a 50%.
6. Racionalizar as consultas de evicção. Referenciação médica obrigatória e redefinição da sua estrutura.